

Jo 自己注射「Saxenda」を使用される方へ

必ず下記項目をご自身でチェックしてご使用ください



<お薬について>

- お薬の名前がサクセンダであることを確認しましたか
- 投与する量を知っていますか

<注射の準備>

- ゴム栓（サクセンダ本体の先端部）を消毒綿で拭きましたか
- 注射針をサクセンダに正しく取り付けましたか

<ダイヤル設定>

- 医師に指示された投与量にダイヤルを合わせましたか
- ダイヤルを回し過ぎた時の対処法を知っていますか
- ダイヤルはお薬の残量以上は回らないことを知っていますか

<注射の仕方>

- 注射部位を消毒綿で拭きましたか
- 注射後、注入ボタンを最後まで押し、ゆっくり6秒数えましたか
- 注射後、注入ボタンを押したまま針を抜きましたか
- 1日1回、起床時に注射しましたか

<注射が終わった後>

- 注射後すぐにキャップ（針ケース）をかぶせて、注射針を外しましたか
- 使用済みの注射針は市町村のルールに従って正しく廃棄していますか
- サクセンダにキャップをつけましたか

<その他>

- 注射針は毎回新しいものを使っていますか
- 使用中のサクセンダを常温で保存していますか
- 未使用のサクセンダを冷蔵庫の中の凍らないところに入れてありますか
- サクセンダは凍らせてはいけないことを知っていますか
- 低血糖に備えて砂糖やブドウ糖が入った飲み物や食べ物を携帯していますか

自己注射の打ち方

針の取り付け

付属の針を先端に回して取り付けて
キャップと針カバーを外します

ステップ
01



0.6mg



ステップ
02

ダイヤルの調整

ダイヤルを、ご自身が使う量にセッ
トします。(初めての方は0.6mg)

注射

お腹の横などに垂直にさし、後ろのボタンを押して
ダイヤルが「0mg」になるまで注入します。
(注入が終わってもすぐに抜かず、6秒待ちます。)

ステップ
3



ステップ
04

キャップの装着

ボタンを押した状態のまま抜き、
使い終わったら1で使用したキャップを再び回して
取り付けて針を外し終了です。



下記の注意事項をよくお読みください

- 朝または夕方の空腹時に1日1回同じ時間に注射します（起床時をお勧めします。）
- お腹または太ももの外側に注射をしてください
- 毎日同じ場所に刺すと皮膚が固くなり、効き目が悪くなることがあります
前回注射した場所から2~3cmほど離れた部位に注射をしてください
- 医師の指導なしでご自身で投与量を変更しないでください
- 投与量を間違えたり、2回注射した場合、翌日からは通常量を投与してください
※強い不快感が出た場合は、当院にご相談ください
- 使用済みの注射針はペットボトルなどの硬い容器に入れて保管してください。
- 廃棄する場合は各市町村のルールに従ってください。
※許可されている場合は保管している容器ごと燃えるゴミに出してください。
また、お近くの医療機関や薬局で回収してもらえる場合がございます。
- 当院宛に容器ごとお送りいただけましたら回収いたします。※送料はご負担ください。



サクセンダの使い方に関して、ご不明な点がございましたらHPまたは下記公式ラインより、お気軽にクリニックにお問い合わせください。

LINEお友達登録はこちらから



~男性専門のオンラインクリニック~
24時間365日HPにて無料相談受付中

<https://clinic-jo.life/>